


500ml

DELTACAPSFORTE

Deltametrina.....2,50%
Coadyuvantes y excipientes c.s.p.100%

SUSPENSIÓN CONCENTRADA DE MICRO-CÁPSULAS INSECTICIDAS EN BASE ACUOSA DISEÑADA PARA COMBINAR EFICACIA Y PERSISTENCIA FRENTE A UN AMPLIO ESPECTRO DE PLAGAS.



Responsable de la puesta en el mercado:

SHARDA SPAIN, S.L. B-12874566

Avda. José Ortiz, 59 Bajo

Telf/Fax 964 56 19 83

12550 - ALMAZORA (Castellón)

Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0878-CV

INDICACIONES DE USO:

Insecticida microencapsulado con centrado en base acuosa, diseñado para combinar eficacia y persistencia. Especialmente indicado para combatir cucarachas, etc. en lugares donde se requiera una baja toxicidad (hospitales, industria alimentaria, centros de enseñanza, etc.)

MODO DE EMPLEO:

· Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar en presencia de personas.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

La aplicación del producto DELTACAPS FORTE en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados

Debido a la persistencia del producto, la repetición del tratamiento no deberá hacerse antes de transcurridos seis meses y sólo

cuando éste sea estrictamente necesario para lo cual se habrá llevado a efecto pruebas de diagnóstico previo que confirmen la existencia de la plaga.

Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones

tratados previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

No mezclar con otros productos químicos

Contiene mezcla de isotiazolonas. Puede provocar una reacción alérgica

Modo de empleo: Brocheo o pulverización localizada del producto diluido en agua en zócalos/suelos

No podrá aplicarse en forma aérea ni en superficies donde se manipulen, preparen, con su mano sirvan alimentos

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso

Evitar el contacto con las superficies tratadas

APLICACIÓN:

DELTACAPS FORTE se aplica diluido en agua según las concentraciones requeridas para cada tipo de tratamiento.

El producto se aplicará sobre las superficies limpias y exentas de restos de grasa aceite, comida u otros productos orgánicos

Impregnar adecuadamente las zonas siguiendo las dosis de aplicación

DOSIFICACIÓN:

Tratamiento de baja intensidad: diluir DELTACAPS FORTE al 1 % y aplicar la suspensión mediante pulverización convencional por la zona a tratar.

· Tratamiento de gran infestación: diluir DELTACAPS FORTE al 2%. Y aplicar la suspensión mediante los pulverizadores convencionales en las zonas comprometidas a tratar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Pulverizador convencional .

Pulverizador de presión previa

PROCEDIMIENTO

Aplicar 1 litro de suspensión de DELTACAPS FORTE al 1% en 10 m² de superficie

USOS AUTORIZADOS:

Higiene alimentaria. Uso exclusivo por personal especializado.

N



PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

FRASES DE RIESGO:

· R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

· S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

· S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

· S23 No respirar los aerosoles.

· S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel.

· S29 No tirar los residuos por el desagüe.

· S36/37 úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.

· S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

· S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

· S61 Evítense su liberación al medio ambiente.

Recábase instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS:

· Retire a la persona de la zona contaminada.

· Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

· Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.

· Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar.

· Conserve la temperatura corporal.

· Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

· Si la persona esté inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

· Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJAR SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR:

Irritación de piel y ojos.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO:

· Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

TEL 91 582 04 20

Nº Registro D.G.S.P.: 09-30-05494-HA

