

DELTA SECT

▶ EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ SUSPENZNÍ KONCENTRÁT (SC)

1L



Výrobce: Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Dovozce do ČR:



PROFESIONÁLNÍ



EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ SUSPENZNÍ KONCENTRÁT (SC)

Název přípravku: Deltasect

Emulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát (SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiků, proti dospělým komárům, švábům, mouchám a mravencům.

Účinné látky: Deltamethrin 25 g/litr (2,5%)
Vzhled přípravku: Bílá suspenze

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 28564/2013/SOZ

N



Nebezpečný pro životní prostředí

Upozornění:

Ohrožuje zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi a při zasažení očí
Dráždí oči a kůži
Pro včely škodlivý
Pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití

R 50/53 Vysoko toxický pro vodní organismy, může

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S23: Nevdechujte páry a aerosoly

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

S51: Používejte pouze v dobře větráných prostorách
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Mechanismus účinnosti:

Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy působí kontaktně i požitově.

Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.

Návod k použití

Přípravek Deltasect naředte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohů místností, kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat.

Dávkování

PROTI LÉTAJÍCÍMU HMYZU	PROTI LEZOUCÍMU HMYZU
50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m ²	50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m ²

Reziduální účinnost minimálně 7 dní.
Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům ve vnitřních prostorách domů a v jejich bezprostředním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, restauracích, kantinách, barech, ve skladech, ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.

Bezpečnostní opatření

Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku.

Kontaminovaný ochranný oděv použijte znovu až po vyprání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekřte.

Po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje.

Naředěný přípravek ihned spotřebujte.

Pracovní směs musí být připravena vždy těsně před aplikací.

Může působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže

Toxický pro ryby a vodní organismy.

Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže naředěným přípravkem nebo vodou použitou k vyplachování postřikovačů a obalů přípravku.

První pomoc:

Při náhodném požití: nevyvolávejte zvracení. Postiženému nepodávejte nic k pití ani k jídlu. Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. Vypláchněte ústa vodou a postiženého dopravte k lékařskému ošetření.

Při zasažení očí: Otevřené oko/oči vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

Při vdechnutí: Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch ale udržujte jej v teple. Vyhledejte lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Skladování

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem.



Odstraňování obalů a zbytků přípravku

Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Balení: 1000 ml

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

