

**SL**

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

**GETOX ULTRA**

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

**Številka dovoljenja: SI-0002733-0000**

**Številka proizvoda v R4BP: SI-0002733-0000**

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	DELTASECT 015 RTU
--------------	-------------------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Sharda Europe B.V.B.A
	Naslov	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Številka dovoljenja		SI-0002733-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0002733-0000
Datum dovoljenja		16/04/2026
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		02/03/2036

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Sharda Cropchem España S.L.,
Naslov proizvajalca	Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina N°3, Planta 12, 30006 Murcia, Španija
Kraj proizvodnih obratov	Sharda Cropchem España S.L. site 1: I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591 No. 10, 24040 Fornovo San Giovanni, Italija Sharda Cropchem España S.L., site 2: FERBI Srl, Viale Io Maggio – C.da Ripoli, 64023 Mosciano S. Angelo, Italija Sharda Cropchem España S.L., site 3: Lérida Unión Química S.A., C/ Afueras s/n, 25173 Sudanell, Španija Sharda Cropchem España S.L., site 4: Asplant - Skotniccy Spółka Jawna, 43600 Jaworzno, Poljska Sharda Cropchem España S.L., site 5: Productos Flower, S.A., Pol. Ind. la Canaleta, 25300 Tárrega, Lleida, Španija

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	deltamethrin
Ime proizvajalca	Sharda Europe B.V.B.A (acting for Sharda Cropchem Limited (India))
Naslov proizvajalca	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W), 400050 Mumbai Indija
Kraj proizvodnih obratov	Sharda Cropchem Limited site 1 Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali (W) 400092 Mumbai Indija

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Aktivna snov	52918-63-5	258-256-6	0,0153 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL Any other liquid (RTU)

---

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino pooblaščenim podjetjem za ravnanje z odpadki v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo pooblaščenim podjetjem za ravnanje z odpadki v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi.

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1.**

**Zmanjšanje populacije muh v zaprtih prostorih, s strani splošnega uporabnika**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelek za zmanjšanje populacije muh znotraj prostorov (hiše in stanovanja), razen poroznih površin.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Musca domestica</i> Splošno ime: domača muha Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: <i>Stomoxys calcitrans</i> Splošno ime: hlevska muha Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  Proizvod za zmanjšanje populacije muh v stanovanjskih prostorih (hišah in stanovanjih), razen na poroznih površinah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje  Podroben opis: Izdelek uporabljati nerazredčen samo s točkovnim razprševanjem po površinah (razen poroznih površin), na katerih običajno posedajo žuželke (npr. po okenskih okvirjih, okrog oken in njihovih robov, stenske površine in stropi) in ki niso redno mokro čiščene
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 50 ml/m <sup>2</sup> Redčenje (%): 0 Odmerek: 50 ml izdelka na 1 m <sup>2</sup> . Ne pršite po celotnih površinah. Pršite po posameznih mestih – z enkratnimi pritiski na sprožilec. 50 ml izdelka razpršite s 65 pritiski na sprožilec. Izdelek začne učinkovati 1 teden po nanosu. Učinkovitost traja do 8 tednov po nanosu. Ne uporabljajte več kot 11-krat na leto.  Število in časovni razpored uporabe: Izdelek začne učinkovati 1 teden po nanosu. Učinkovitost traja do 8 tednov po nanosu. Ne uporabljajte več kot 11-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Steklenica (HDPE) z navojnim pokrovčkom z ročnim vzvodnim sprožilcem in konico tipa odpri-zapri: 100 - 1000 ml.

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Ugotoviti mesta, po katerih običajno posedajo žuželke (npr. na okenskih okvirjih, okrog oken in njihovih robov, na stenah, stropih), ter nanašati izdelek točkovno po površinah, ki niso redno mokro čiščene, z izjemo poroznih površin.

Pršilna naprava mora biti ustrezno opremljena s posebnim pršilnim mehanizmom, npr. po potrebi tudi s pršilno sulico ali šobo, da bo možno izdelek ustrezno nanesti na izbrano površino

#### 4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

glej razdelek 5.2

#### 4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

glej razdelek 5.3

#### 4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

glej razdelek 5.4

#### 4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

glej razdelek 5.5

### 4.2. Opis uporabe

**Tabela 2.**

#### **Zmanjšanje populacije muh v zaprtih prostorih, s strani poklicnih uporabnikov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Proizvod za zmanjševanje populacije muh znotraj prostorov (hiše in stanovanja), v prostorih za javne namene (npr. kinematografi, vojašnice, hoteli, restavracije, bari, menze, bolnišnice) ter v gospodarskih objektih (npr. skladišča), z izključitvijo uporabe z nanosom na porozne površine.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Musca domestica</i> Splošno ime: house fly - domača muha Razvojna faza: odrasli  Znanstveno ime: <i>Stomoxys calcitrans</i> Splošno ime: stable flies - hlevska muha Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  Proizvod za zmanjšanje populacije muh v stanovanjskih prostorih (hiše in stanovanja), javnih prostorih (npr. kinodvorane, vojašnice, hoteli, restavracije, bari, menze, bolnišnice) in industrijskih prostorih (npr. skladišča), razen na poroznih površinah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje  Podroben opis: Nanos na neporozne površine
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 50 ml/m <sup>2</sup> Redčenje (%): 0 Odmerek: 50 ml izdelka na 1 m <sup>2</sup> . Ne pršite po celotnih površinah. Pršite po posameznih mestih

	<p>– z enkratnimi pritiski na sprožilec. 50 ml izdelka razpršite s 65 pritiski na sprožilec. Izdelek začne učinkovati 1 teden po nanosu. Učinkovitost traja do 8 tednov po nanosu. Ne uporabljajte več kot 11-krat na leto.</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Izdelek začne učinkovati 1 teden po nanosu. Učinkovitost traja do 8 tednov po nanosu. Ne uporabljajte več kot 11-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica (HDPE) z navojnim pokrovčkom z ročnim vzvodnim sprožilcem in konico tipa odpri-zapri: 100 - 2500 ml.

#### 4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Pršilna naprava mora biti ustrezno opremljena s posebnim pršilnim mehanizmom, npr. po potrebi tudi s pršilno sulico ali šobo, da bo možno izdelek ustrezno nanesti na izbrano površino.

Uporabljajte metode integriranega zatiranja škodljivcev (IPM), kot je kombinacija kemičnih in fizikalnih metod zatiranja ter drugih javnozdravstvenih ukrepov, pri čemer upoštevajte lokalne razmere (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoje uporabe itd.).

Izmenično uporabljajte izdelke, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja (za odstranitev odpornih posameznikov iz populacije).

Za prilagoditev metod zatiranja upoštevajte življenjski cikel in značilnosti žuželk, na katere ciljate. Zlasti upoštevajte najbolj dovzetno razvojno stopnjo žuželke, pogostost uporabe in območja, ki jih je treba tretirati. Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja sum ali potrjena odpornost na aktivno snov, ki jo vsebuje ta proizvod.

Preverite učinkovitost proizvoda na mestu uporabe: po potrebi ugotovite vzroke za zmanjšano učinkovitost, da se prepričate, da ni prisotna odpornost, ali da ugotovite morebitno odpornost.

Če je za zatiranje muh potrebno daljše obdobje, je treba učinkovanje s proizvodom izvajati izmenično s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi z drugačnimi načini delovanja.

Če se učinkovitost zmanjša ali obstaja sum na odpornost, takoj prenehajte z uporabo proizvoda.

#### 4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Določite mesta, kjer se žuželke običajno zbirajo (npr. na okenskih okvirjih, okoli oken in robovih, na stenah ali stropih) in izdelek popršite le redko po neporoznih površinah, ki jih ne čistite redno z vodo.

Ne prati delovnih kombinezonov, temveč jih zavrzite kot trdne odpadke. Kombinezone za enkratno uporabo zavrzite v skladu z nacionalnimi/regionalnimi predpisi.

Upoštevajte kodekse dobre prakse (npr. IPM).

#### 4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

glej razdelek 5.3

#### 4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

glej razdelek 5.4

#### 4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

glej razdelek 5.5

---

---

---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>**

### **5.1. Navodila za uporabo**

GETOX ULTRA je izdelek, pripravljen za uporabo.

Pred uporabo vedno prej preberite vsebino na etiketi ali v navodilih za uporabo ter upoštevajte vsa priložena navodila.

Proizvod je na voljo v steklenicah, opremljenih s sprožilnim razpršilcem.

Pred uporabo proizvoda steklenico nekajkrat pretresite. Po nastavitvi simbola razprševanja odprite pršilno šobo in močno pritisnite na ročico/sprožilec.

Po uporabi temeljito prezračite prostore, v katerih je bil proizvod uporabljen.

Po vsakokratni uporabi preostanek proizvoda varno shranite do naslednje uporabe.

Proizvod ni namenjen za uporabo hkrati z drugimi proizvodi.

Ne nanašati na posteljnino, oblačila, igrače.

Proizvoda ne nanašajte neposredno na mačke, kot tudi ne na predmete, s katerimi lahko le-te pridejo v stik.

Preprečevati stik s kožo ali očmi. Po vsaki uporabi si obvezno temeljito umijte roke.

Ne vstopajte na tretirano območje, dokler se ne posuši.

Med uporabo proizvoda se ne sme jesti, piti, kaditi.

Proizvod uporabljajte v priporočenih odmerkih in časovnih intervalih.

Izogibajte se neprekinjeni uporabi biocidnega proizvoda.

Uporabo biocidnega proizvoda se lahko kombinira s sanitarnimi ukrepi za vzdrževanje higiene (npr. čiščenje, odstranjevanje virov prehranjevanja ciljnih organizmov).

Obvestiti imetnika dovoljenja, če se uporaba proizvoda izkaže za neučinkovito.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Tega proizvoda ne uporabljajte neposredno na ali v bližini hrane, krme, pitne vode ali pijače, ali na površinah ali pripomočkih, ki lahko pridejo v neposreden stik s hrano, krmo, pitno vodo ali pijačo ali z domačimi živalmi ali hišnimi ljubljenci.

Preprečiti mačkam dostop do površin, na katere je bil naneseo proizvod. Proizvod vsebuje deltametrin, ki lahko povzroči pri mačkah resne neželene učinke.

Ne uporabljajte v prostorih, kjer so akvariji in/ali terariji.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Neželeni stranski učinki: Piretroidi [npr. deltametrin] lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek ali mravljinčenje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, se je treba posvetovati z zdravnikom. Če potrebujete zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo ali etiketo proizvoda.

Prva pomoč

**PRI VDIHU:** če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

**PRI ZAUŽITJU:** Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

**PRI STIKU S KOŽO:** Odstraniti vsa kontaminirana oblačila in jih pred ponovno uporabo oprati. Sperite kožo z vodo. V primeru draženje kože ali izpuščajev: se posvetujte z zdravnikom.

**PRI STIKU Z OČMI:** Če se pojavijo simptomi, si oči izperite z vodo. Če nosite kontaktne leče in jih lahko brez težav odstranite, jih odstranite. Posvetujte se z zdravnikom.

Prva pomoč za mačke:

Deltametrin je lahko nevaren za mačke. V primeru izpostavljenosti se je treba takoj posvetovati z veterinarjem in mu pokazati embalažo proizvoda.

Ukrepi za zaščito okolja:

- Previdnostna ravnanja na področju varovanja okolja:

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

Preprečevati raširjenje proizvoda po naravnem okolju ter njegovo vstopanje v elemente le-tega (v površinske in podzemne vode), kanalizacijo, drenažne kanale itd. z vzpostavljanjem zaščitnih pregrad in zapiranjem odtokov. Obvestite lokalne organe, če ni možno zavarovati okolja (uhajanje v vodne poti, odtoke, kanalizacijo).

- Metode in materiali za preprečevanje širjenja v primeru razlitja:

Razliti proizvod zadržite s kemično inertnim materialom (npr. peskom, kaolinom) in ga shranite v zaprte posode za kasnejšo odstranitev kot nevarni odpadki.

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

- Proizvoda ne odlagajte v kanalizacijo.
- Ne dovolite, da izdelek onesnaži podtalnico in površinske vode.
- Prazne posode ne sežigajte.
- Prazne posode ne uporabljajte za noben drug namen, vključno z recikliranjem.

Ostanke proizvoda, proizvod s pretečenim rokom uporabe in prazne posode oddajte kot nevarne odpadke pri pooblaščenem podjetju za odstranjevanje odpadkov. Ne mešajte z drugimi odpadki.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite v originalni, zaprti embalaži na suhem, dobro prezračevanem mestu pri sobni temperaturi, ločeno od hrane, pijače in živalske krme. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vročino in vlago. Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali ali hišnih ljubljencev.

Rok uporabnosti je 2 leti.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

Ta biocidni proizvod vsebuje deltametrin, ki je nevaren za čebele.  
Čista vsebnost deltametrina v proizvodu: 0,0151 g na 100 g.