

35gr



# IMIDASECT

PROFESIONÁLNÍ

GELOVÁ NÁSTRAHA PROTI RUSŮM S ŠVÁBŮM

Imidacloprid 21,5 g/kg (2,15%)

**Vzhled přípravku:** Hnědý gel

MZDR 17834/2013/SOZ

**Upozornění:** Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití, dodržujte doporučené dávkování a všechny podmínky v něm doporučené. Výrobce zaručuje kvalitu přípravku pokud je v originálním obalu a používán doporučeným způsobem. Dodržujte pokyny abyste se vyvarovali ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí. Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravin. Naaplikujte nástrahu do blízkosti potravin, jídelních příborů a nádobí ani na plochy s nimiž přicházejí potraviny do kontaktu.

N



**Nebezpečný pro životní prostředí**

R51/53: Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2: Uchovávejte z dosahu dětí. S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25: Zamezte styku s kůží a očima. S29: Nevylévejte do kanalizace. S37: Používejte vhodné ochranné rukavice. S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení). S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

**Výrobce:** SHARDA Europe b.v.b.a.

Jozef Mertensstraat 142

1702 Dilbeek

Belgium

**Dovozce do ČR:**

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

## První pomoc:

Obecná doporučení: Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Pokud je pravděpodobné, že pacient ztratí vědomí, transportujte jej k lékaři ve stabilizované poloze na boku. Odstraňte ihned kontaminované nebo nasáklé oblečení. Při zasažení kůže: Ihned umyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Při zasažení očí vymyjte důkladně vodou. Vyhledejte lékařské ošetření. Při polknutí: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte ihned lékařské ošetření. První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

## Aplikační dávky:

Druh hmyzu	Při mírnějším zamoření	Při silném zamoření
Rus domácí Šváb hnědopásý	1 kapka o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>	2 kapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>
Šváb obecný Šváb americký	2 kapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>	3 kapky o hmotnosti 0,1 g/m <sup>2</sup>

Poznámka: 1 kapka o hmotnosti 0,1 g má průměr 5mm

Naaplikujte nástrahu na místa často uklízená, kde může být zničena nebo odstraněna. Neaplikujte nástrahu na místa omývaná vodou, která může nástrahu poničit. Neaplikujte nástrahu na plochy ošetřené postřikem insekticidů. Aplikovanou nástrahu nepostřikujte insekticidními přípravky. Nástraha může působit odbarvení textilu.

## Bezpečnostní opatření:

Po použití přípravku Imidasect a před jídlem si umyjte ruce mýdlem a vodou. Neaplikujte gel na plochy, kde jsou nebalené potraviny uloženy, upravovány nebo konzumovány. Chraňte potraviny, kuchyňské potřeby a přístroje před kontaminací během použití. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Toxický pro ryby. Neznečišťuje vodní nádrže, vodní toky nebo kanalizaci přípravkem nebo jeho obaly.