

1Kg

SOFAST



▶ GRANULOVANÁ NÁSTRAHA PROTI MOUŠE DOMÁCÍ

Imidacloprid 5g/kg

Výrobce:

SHARDA Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
BELGIQUE

Dovozce a distributor v ČR:



PROFESIONÁLNÍ

PROFESIONÁLNÍ

N



N- nebezpečný pro životní prostředí

- R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 S2: Uchovávejte z dosahu dětí
 S13: Uchovávejte odděleně od potravin,

nápojů a krmiv
 S22: Nevdechujte prach
 S23: Nevdechujte plyny/ aerosoly
 S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
 S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
 S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)
 S51 Používejte pouze v dobře větrávaných prostorách.
 S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
 S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

První pomoc:

Obecná doporučení: Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Pokud je pravděpodobné, že pacient ztratí vědomí, transportujte jej k lékaři ve stabilizované poloze na boku. Odstraňte ihned kontaminované nebo nasáklé oblečení
Při zasažení kůže: ihned umyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím vody.
Při zasažení očí: Při zasažení očí vymyjte důkladně vodou. Vyhleďte lékaře k ošetření.
Při polknutí: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhleďte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým informačním střediskem, Kliniky nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93, nebo 224 91 54 02.



Granulovaná nástraha k přímému použití proti dospělým mouchám domácím. Nástraha může být smíchána s vodou a aplikována i náterem nebo postřikem. Nástraha je určena pro použití v objektech živočišné výroby, v bytech, potravinářských provozovnách, kuchyních veřejného stravování apod.

Obsahuje (Z)-9-tricosene, který může způsobit alergické reakce
 Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 21644/2013/SOZU**Upozornění:**

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiku. Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní opatření a doporučené dávkování a všechny podmínky bezpečného používání.

Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. Při používání nástrahy by měla být dodržována všechna pravidla bezpečnosti práce, za níž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na všechny faktory a podmínky, v nichž je nástraha aplikována. Výrobce zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, že byl prodán v originálním balení, skladován a používán doporučeným způsobem.

Mechanismus účinnosti:

Imidacloprid, účinná látka přípravku Sofast patří mezi neonicotinoidy, se váže na neurony hmyzu. Tato vazba působí narušení přenosu nervových impulsů, což je pro hmyz smrtelné. Sofast obsahuje cukr a feromon (Z) - 9-trikosen, obě tyto látky dospěle mouchy ke granulím lákají, což zvyšuje jejich účinnost. Přípravek obsahuje hořkou látku, která brání dětem a necílovým organismům přípravek požití.

Návod k použití:

V objektech živočišné výroby, ve výrobnách a prodejnách potravin a v domácnostech a všude tam, kde se mouchy domácí pravidelně vyskytují. Granule bez dalších úprav mohou být stejnoměrně rozspany na suché, vodorovné, lidem a zvířatům nepřístupné plochy (parapety oken, římsy a pod.), v průměrné dávce 200 g na 100 m². Granule bez dalších úprav mohou být v množství kolem 10 g umístěny do mělkých misek, avšak tak, aby netvořily kopečky. Misky se rozmístí do prostředí, na každých 10 m² podlahové plochy jednu, nejlépe na vyvýšená místa, jako jsou police, římsy, parapety oken apod. Misky kontrolujte každé 2-3 dny a položte granule nové, jestliže jsou pokryty prachem, nebo mrtvými těly much. Je rovněž vhodné granule mírně navlhčit, pro zvýšení jejich atraktivitu.

Aplikace postřikem:

100 g granulí je možné přidat do 100 ml vody, dobře promíchat a ponechat stát nejméně 15 minut. Směs se aplikuje tlakovým postřikovačem maximálně 7-8 hodin po přípravě roztoku, na nepérezní povrchy, na něž mouchy často sedají. Aplikace náterem: 200 g granulí je možné přidat do 150 ml vody, dobře promíchat a nechat stát nejméně 20 min. Směs aplikujte náterem pomocí štětce, maximálně 7-8 hod po přípravě roztoku, na nepérezní povrchy, na místa, na něž mouchy často sedají.

Poznámky:

Nepokládejte granule do blízkosti nebalených potravin a krmiv. Nepokládejte granule do blízkosti nádobí a povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami a krmivy. Nepokládejte na místa, která jsou pravidelně uklizena a při úklidu by mohly být granule přemístěny na místa, kde by mohly přijít do kontaktu s potravinami a krmivy. Nepokládejte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, protože voda granule poškodí. Nepokládejte granule na místa čerstvě ošetřena postřikem insekticidů. Položte granule nepostřikujte žádnými insekticidů. Granule mohou poškozovat barvu textilních tkanin.

Bezpečnostní opatření:

Po práci s přípravkem SOFAST a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte granule na povrchy na nichž jsou potraviny a krmiva skladovány, připravovány nebo konzumovány. Během aplikace chraňte potraviny, krmiva, nádobí, jídelní přístroje a potřeby pro přípravu krmiv, před kontaminací granulemi. Neaplikujte granule na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek, mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem. S přípravkem nakládejte a obaly s ním otevřete tak, aby nedocházelo k unikání přípravku do okolí.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani pro vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.



Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

