

CS

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

SOFAST

Typ přípravku (typy přípravků)

PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců

Číslo povolení: CZ-0011490-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: CZ-0011490-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názy) přípravku

Obchodní název (názy)	SOFAST
-----------------------	--------

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Číslo povolení		CZ-0011490-0000
Číslo záznamu v registru R4BP		CZ-0011490-0000
Datum udělení povolení		29/09/2017
Datum skončení platnosti povolení		26/06/2034

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
Adresa výrobce	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 EKOPREVENT KFT - Komló u. 10. 1222 Budapest Maďarsko

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Imidacloprid
Jméno (název) výrobce	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
Adresa výrobce	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 40005 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhuang Čína

Účinná látka	Cis-tricos-9-en (Muscalur)
Jméno (název) výrobce	Denka International Holding B.V.
Adresa výrobce	Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Denka International Holding B.V. site 1 Hanzeweg 1 NL-3771 NG Barneveld Nizozemsko

Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	účinná látka	138261-41-3	428-040-8	0,52 % (w/w)
Cis-tricos-9-en (Muscalur)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	účinná látka	27519-02-4	248-505-7	0,1 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

XX Ostatní:

Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208: Obsahuje cis-Tricos-9-ene. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P501: Odstraňte obal vnitrostátními předpisy. P501: Odstraňte obsah vnitrostátními předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte.

Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1.

Profesionální uživatel - Natírání na karton

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Muscidae: Muscidae: Obecný název: ostatní: Mouchy Vývojové stadium: ostatní: Dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorech Vnitřní prostory (průmyslové/obchodní prostory, domácnosti, soukromé a veřejné prostory)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Natírání na karton Podrobný popis: Za účelem ošetření místnosti / budovy s podlahovou plochou 100 m ² se 200 g přípravku rozpustí ve 150 ml vody a nanese na kartonové desky o celkové ploše 1 m ² . Kartonové desky se posléze rozprostřou po ošetřované ploše.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Za účelem ošetření místnosti / budovy s podlahovou plochou 100 m ² se 200 g přípravku rozpustí ve 150 ml vody a nanese na kartonové desky o celkové ploše 1 m ² . Kartonové desky se posléze rozprostřou po ošetřované ploše. Počet a načasování aplikace: Až 6 aplikací ročně.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	10 g sáček HDPE 10 g, 50 g, 100 g lahvička HDPE nebo PP 300 g, 350 g lahvička HDPE 1 kg, 2 kg kbelík PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém obalu (sekundární obal pro sáčky z kompozitního materiálu) 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg plechovka PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém pouzdře 1 kg, 2 kg sáček z kompozitního materiálu (fólie z kompozitního materiálu z LDPE + PP nebo PE nebo papíru)

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

1. Před použitím dobře promíchejte. Míchejte, dokud nedojde k homogenizaci, přibližně 2 minuty.
2. Disperzi použijte do 8 hodin od smíchání.
3. Umístěte kartonové desky na místech, které si mouchy vybírají k odpočinku.
4. Každý týden kontrolujte kartony, pokud na nich není přípravek nebo jsou kartony pokryty nečistotami, obnovte aplikaci.

-
5. Strídejte přípravky obsahující účinné látky s různým způsobem účinku (abyste z populace odstranili rezistentní jedince).
 6. Biocidní přípravek smí být aplikován pouze na kartonové desky. Ty musí být připevněny na stěnách a střepech na místech, které si mouchy vybírají k odpočinku.
 7. Uživatel musí k aplikaci disperze na kartonové desky použít jednorázový štětec.
 8. Plocha, kde se biocidní přípravek míchá/plní a nanáší na kartonové desky, musí být zakryta jednorázovou plastovou fólií, aby se zabránilo kontaminaci okolních povrchů a podlah.
 9. Během míchání/plnění a aplikace biocidního přípravku musí uživatel nosit jednorázový ochranný oblek (alespoň typ 6, ČSN EN 13034), aby se zabránilo kontaminaci kanalizace praním kontaminovaného oděvu.
 10. Zabraňte vniknutí přípravku, jeho zbytků nebo nátěrových kalů do půdy, vodních toků nebo kanalizace.
 11. Ošetřené kartonové desky se nesmí čistit.
 12. Uhynulé mouchy se musí ihned sebrat, a to výhradně suchou cestou (např. vysavačem nebo jednorázovou utěrkou) a poté zlikvidovat s pevným odpadem.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

1. Ošetřené kartonové desky umístěte mimo dosah dětí, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných nečlověčích zvířat.
2. Během míchání/plnění a aplikace na kartonové desky by neměly být přítomny děti a domácí zvířata.
3. Při natírání kartonových desek ponechtejте okraj neošetřený.
4. Při připevňování ošetřených kartonových desek na stěny nebo stropy a při jejich sběru k likvidaci sahejte pouze na neošetřený okraj.
5. Aniž je dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatelů, musí být přijata následující opatření ke zmírnění rizik:
 - Pro metodu nanášení nátěru na kartonové desky je nutné používat ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím, které splňují požadavky evropské normy ČSN EN 374 (vhodný materiál rukavic uvede držitel povolení v informacích o přípravku).
 - Je nutné nosit vhodný jednorázový ochranný oblek proti chemikáliím (minimálně typ 6, ČSN EN 13034).

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Žádný

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Likvidace znečištěných plastových fólií, jednorázových oděvů a kartonů po použití a všech ostatních odpadů (voda na čištění štětců, materiál používaný odstraňování uniklého přípravku atd.) musí být provedena v souladu s místními předpisy.

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Žádný

4.2. Popis použití

Tabulka 2.

Profesionální uživatel - aplikace nástrahy do mělkých jednorázových misek

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Muscidae: Muscidae: Obecný název: ostatní: Mouchy Vývojové stadium: ostatní: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Vnitřní prostory (průmyslové/obchodní prostory, domácnosti, soukromé a veřejné prostory).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Aplikace nástrahy Podrobný popis: 20 g na 10 m2 podlahové plochy; jedno nástrahové místo (mělké jednorázové misky) na 10 m2 podlahové plochy.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 20 g na 10 m2 podlahové plochy; jedno nástrahové místo (mělké jednorázové misky) na 10 m2 podlahové plochy. Počet a načasování aplikace: Až 6 aplikací ročně.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	10 g sáček HDPE 10 g lahvička HDPE nebo PP 50 g, 100 g lahvička HDPE nebo PP s odměrkou/kelímkem 300 g, 350 g lahvička HDPE s odměrkou/kelímkem 1 kg, 2 kg kbelík PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém obalu s odměrkou/kelímkem (sekundární obal pro sáčky z kompozitního materiálu) 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg plechovka PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém pouzdře s odměrkou/kelímkem 1 kg, 2 kg sáček z kompozitního materiálu (fólie z kompozitního materiálu z LDPE + PP nebo PE nebo papír) s odměrkou/kelímkem

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

1. Granule nasypte do mělkých jednorázových misek, aby se netvořily hromádky.
2. K odměření granulí použijte přiloženou odměrku/kelímkem.
3. Vytvořte nástrahová místa s 20 g granulí každých 10 m2 – pouze na vyvýšená místa (police, římsy, stěny).
4. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje granule mírně navlhčit.
5. Kontrolujte nástrahová místa každé 2 až 3 dny.
6. Odstraňte nástrahu, pokud jsou granule pokryté prachem
7. Osoby odpovědné za úklid ošetřených ploch musí být profesionálním uživatelem poučeny o návodu k použití, aby se zajistilo, že se přípravek nedostane do kanalizace.
8. K aplikaci biocidního přípravku se smí používat pouze mělké jednorázové misky a odměrka.
9. Uniklý přípravek, zbytky přípravku a uhynulé mouchy musí být neprodleně a výhradně suchou cestou (např. vysáváním nebo použitím suchých jednorázových utěrek) sebrány a následně zlikvidovány s pevným odpadem.
10. Povrchy kontaminované přípravkem nebo jeho zbytky neumývejte vodou. Pokud povrchy čistíte, použijte jednorázové vlhčené utěrky a poté je zlikvidujte s pevným odpadem.

11. Je nutné zajistit, aby biocidní přípravek nebyl z mělkých jednorázových misek nechtěně vysypán, např. větrem, lidmi nebo většími zvířaty.
12. Odměrku a mělké jednorázové misky se nesmí čistit vodou.
13. Po ošetření shromážděte zbytky přípravku, uniklý přípravek a veškerý další odpad k likvidaci v souladu s místními předpisy.
14. Nerozhazujte přípravek na podlahu a nedovolte, aby se dostal do vodních toků, dřezů, kanalizace nebo životního prostředí.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

1. Přípravek aplikujte mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.
2. Zabraňte kontaktu přípravku s potravinami, nápoji a krmivy pro zvířata, jakož i s kuchyňským náčiním a povrchy pro přípravu pokrmů.

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Žádný

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Žádný

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Žádný

4.3. Popis použití

Tabulka 3.

Profesionální použití v chovech zvířat - natírání na kartonové desky

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Muscidae: Muscidae: Obecný název: ostatní: Mouchy Vývojové stadium: ostatní: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Interiér (stáje pro zvířata).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: natírání na kartonové desky Podrobný popis: Za účelem ošetření místnosti / budovy s podlahovou plochou 100 m ² se 200 g přípravku rozpustí ve 150 ml vody a nanese na kartonové desky o celkové ploše 1 m ² . Kartonové desky se posléze rozprostřou po ošetřované ploše.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka:

	Za účelem ošetření místnosti / budovy s podlahovou plochou 100 m² se 200 g přípravku rozpustí ve 150 ml vody a nanese na kartonové desky o celkové ploše 1 m². Kartonové desky se posléze rozprostřou po ošetřované ploše. Počet a načasování aplikace: Až 6 aplikací ročně. Trvá až 3 týdny po ošetření, než biocidní přípravek účinně reguluje populace much.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	10 g sáček HDPE 10 g, 50 g, 100 g lahvička HDPE nebo PP 300 g, 350 g lahvička HDPE 1 kg, 2 kg kbelík PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém obalu (sekundární obal pro sáčky z kompozitního materiálu) 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg plechovka PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém pouzdře 1 kg, 2 kg sáček z kompozitního materiálu (fólie z kompozitního materiálu z LDPE + PP nebo PE nebo papíru)

4.3.1. Návod k danému způsobu použití

1. Před použitím dobře promíchejte. Míchejte, dokud nedojde k homogenizaci, přibližně 2 minuty.
2. Disperzi použijte do 8 hodin od smíchání.
3. Umístěte kartonové desky na místa, které si mouchy vybírají k odpočinku.
4. Každý týden kontrolujte kartony, pokud na nich není přípravek nebo jsou kartony pokryty nečistotami, obnovte aplikaci.
5. Na začátku sezóny much se doporučuje se doplnit ošetření v zařízeních pro chov zvířat přípravkem proti larvám.
6. Použití biocidních přípravků lze kombinovat s dalšími hygienickými opatřeními (např. častým odstraňováním hnoje) nebo nechemickými prostředky ochrany (např. biologickými prostředky, včetně použití parazitoidů) jako součást integrovaného programu ochrany proti mouchám.
7. Před chemickým ošetřením lze posoudit míru napadení mouchami v chovech zvířat pomocí monitorovacích metod (např. sledování (opětovného) výskytu larev v trusu nebo populace dospělých much pomocí lepicích proužků).
8. Biocidní přípravek smí být aplikován pouze na kartonové desky. Ty musí být připevněny na stěnách a stropěch na místech, které si mouchy vybírají k odpočinku.
9. Uživatel musí k aplikaci disperze na kartonové desky použít jednorázový štětec.
10. Plocha, kde se biocidní přípravek míchá/plní a nanáší na kartonové desky, musí být zakryta jednorázovou plastovou fólií, aby se zabránilo kontaminaci okolních povrchů a podlah.
11. Během míchání/plnění a aplikace biocidního přípravku musí uživatel nosit jednorázový ochranný oblek (alespoň typ 6, ČSN EN 13034), aby se zabránilo kontaminaci kanalizace praním kontaminovaného oděvu.
12. Zabraňte vniknutí přípravku, jeho zbytků nebo nátěrových kalů do půdy, vodních toků nebo kanalizace.
- 13 Ošetřené kartonové desky se nesmí čistit.
14. Před čištěním a / nebo dezinfekcí v zařízeních pro chov zvířat odstraňte všechny ošetřené kartonové desky.
15. Nepoužívejte biocidní přípravek přímo na hnůj/kejdou.

4.3.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

1. Ošetřené kartonové desky umístěte mimo dosah dětí, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.
2. Během míchání/plnění a aplikace na kartonové desky by neměly být přítomny děti a domácí zvířata.

3. Při natírání kartonových desek ponechtejте okraj neošetřený.
4. Při připevňování ošetřených kartonových desek na stěny nebo stropy a při jejich sběru k likvidaci sahejte pouze na neošetřený okraj.
5. Kartonové desky ošetřené biocidním přípravkem umístěte mimo dosah hospodářských zvířat.
6. Aniž je dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatelů, musí být přijata následující opatření ke zmírnění rizik:
 - Pro metodu nanášení nátěru kartonových desek se vyžaduje nošení ochranných rukavic odolných vůči chemikáliím, které splňují požadavky evropské normy ČSN EN 374 (vhodný materiál rukavic uvede držitel povolení v informacích o přípravku).
 - Je nutné nosit vhodný jednorázový ochranný oblek proti chemikáliím (minimálně typ 6, ČSN EN 13034).

4.3.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Žádný

4.3.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Likvidace znečištěných plastových fólií, jednorázových oděvů a kartonů po použití a všech ostatních odpadů (voda na čištění štětců, materiál používaný na odstraňování uniklého přípravku atd.) musí být provedena v souladu s místními předpisy.

4.3.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Žádný

4.4. Popis použití

Tabulka 4.

Profesionální použití v chovech zvířat - aplikace nástrahy v nástrahových staničkách

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: <i>Stomoxys calcitrans</i> Obecný název: ostatní: Bodalka stájová Vývojové stadium: ostatní: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Interiér (zařízení pro chov hospodářských zvířat).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Aplikace návnady Podrobný popis: 20 g na 10 m ² podlahové plochy; jedna nástrahová stanička na 10 m ² podlahové plochy.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 20 g na 10 m ² podlahové plochy; jedna nástrahová stanička na 10 m ² podlahové plochy.

	Počet a načasování aplikace: Až 6 aplikací ročně. Biocidní přípravek účinně kontroluje stabilní populace much až 4 týdny po ošetření.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	10 g sáček HDPE 10 g lahvička HDPE nebo PP 50 g, 100 g lahvička HDPE nebo PP s odměrkou/ kelímkem 300 g, 350 g lahvička HDPE s odměrkou/kelímkem 1 kg, 2 kg kbelík PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém obalu s odměrkou/kelímkem (sekundární obal pro sáčky z kompozitního materiálu) 50 g, 300 g, 1 kg, 2 kg plechovka PP nebo polyester s LDPE těsnicí fólií v kartonovém pouzdře s odměrkou/kelímkem 1 kg, 2 kg sáček z kompozitního materiálu (fólie z kompozitního materiálu z LDPE + PP nebo PE nebo papír) s odměrkou/ kelímkem

4.4.1. Návod k danému způsobu použití

1. K odměření granulí použijte přiloženou odměрку/kelímek.
2. Vytvořte nástrahová místa s 20 g granulí každých 10 m² – pouze na vyvýšená místa (police, římsy, stěny).
3. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje granule mírně navlhčit.
4. Kontrolujte nástrahová místa každé 2 až 3 dny.
5. Odstraňte nástrahu, pokud jsou granule pokryté prachem
6. Na začátku sezóny much se doporučuje se doplnit ošetření v zařízeních pro chov zvířat přípravkem proti larvám.
7. Použití biocidních přípravků lze kombinovat s dalšími hygienickými opatřeními (např. častým odstraňováním hnoje) nebo nechemickými prostředky ochrany (např. biologickými prostředky, včetně použití parazitoidů) jako součást integrovaného programu ochrany proti mouchám.
8. Před chemickým ošetřením lze pomocí monitorovacích metod (např. sledování (opětovného) výskytu larev v hnoji nebo populace dospělých much pomocí lepicích proužků) odhadnout napadení mouchami v chovech zvířat.
9. Aplikujte pouze v doporučených nástrahových stanicích (specifických pro mouchy). K umístění granulované nástrahy použijte odměрку.
10. Odměrka a nástrahová stanička se nesmí mýt vodou.
11. Biocidní přípravek neaplikujte přímo na hnůj/kejdou.
12. Před čištěním a / nebo dezinfekcí v zařízeních pro chov zvířat odstraňte všechny nástrahové stanice.

4.4.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

1. Přípravek aplikujte mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.
2. Zabraňte kontaktu přípravku s potravinami, nápoji a krmivy pro zvířata, jakož i s kuchyňským náčiním a povrchy pro přípravu pokrmů.
3. Umístěte nástrahové staničky mimo dosah hospodářských zvířat.
4. Nepoužívejte přípravek v přítomnosti a k hubení much domácích (*Musca domestica*), aby se zabránilo vzniku rezistence (protože dostatečná účinnost byla prokázána pouze proti bodalkám stájovým (*Stomoxys calcitrans*)).

4.4.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Žádný

4.4.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Žádný

4.4.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Žádný

Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ¹

5.1. Návod k použití

1. Začněte s ošetřením na začátku sezóny much, abyste zabránili masovému rozmnožování.
2. Vyhněte se nepřetržitému používání přípravku.
3. Abyste zabránili vzniku rezistence vůči účinné látce, střídejte přípravky s různými způsoby účinku a vyhněte se časté opakované aplikaci stejné účinné látky.
4. Pokud ošetření není úspěšné, informujte držitele povolení.
5. Tento přípravek obsahuje účinnou látku imidakloprid, která je nebezpečná pro včely.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

1. Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo návod k použití a dodržujte všechny pokyny.
2. Neaplikujte na potraviny, nápoje nebo krmivy pro zvířata, v jejich blízkosti nebo na površích či předmětech, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, nápoji, krmivy nebo zvířaty.
3. Rozsypaný biocidní přípravek okamžitě seberte.
4. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem. Nesprávné použití může způsobit poškození zdraví.
5. Nevypouštějte přípravek do kanalizace
6. Zabraňte úniku přípravku, jeho zbytků nebo oplachové vody při čištění pracovních pomůcek (např. nádoby, štětce) do vodních zdrojů nebo kanalizace.
7. Přípravek lze používat v přítomnosti zvířat, pokud se zabrání kontaktu s biocidním přípravkem.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

1. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte je vodou, v případě potřeby vyjměte kontaktní čočky. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
2. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstraňte oděv. Opláchněte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. (Před opětovným použitím oděv vyperte).
3. PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
4. PŘI POŽITÍ: Pokud se objeví příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

1. Uchovávejte pouze v původním obalu.
2. Nemíchejte s jiným odpadem.
3. Zbytky přípravku a jakýkoli jiný kontaminovaný odpad (např. jednorázové plastové fólie, ploché tácky, dávkovací lžice a kartáče, materiál použitý k zachycení rozlitého přípravku, mrtvé mouchy) musí být zlikvidovány v souladu se směrnicí (2008/98/ES) a Evropským katalogem odpadů (EWC) a národními a regionálními předpisy.
4. S obaly obsahující zbytky přípravku musí být odpovídajícím způsobem nakládáno:
 - Kód odpadu: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 - Kód odpadu: 20 01 19* Pesticidy

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

1. Doba skladovatelnosti je 12 měsíců.
2. Chraňte před slunečním zářením.
3. Skladujte na suchém místě.
4. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

¹Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE

1. Přípravek obsahuje hořkou látku.

2. Podle dostupných informací přípravek obsahuje nanomateriál podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. z) nařízení (EU) č. 528/2012.

Směrnicí Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se míní zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 180/2015 Sb., nařízení vlády č. 375/2017 Sb., zákon č. 285/2020 Sb., zákon č. 88/2016 Sb. a další právní předpisy upravující ochranu zdraví při práci.

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402