

1Kg

# SOFAST



► KÖDERGRANULAT GEGEN FLIEGEN

Imidacloprid 0,5% w/w

**Hersteller**

Sharda Cropchem Ltd, Domic Holm,  
29th Road, Bandra (West), Mumbai, Indien  
Tel : +91 22 66782800  
Fax: +9122 66782828 / 66782808

**Vertreiber**



**Wirkstoff:** Imidacloprid 0,5% (w/w)  
**Formulierung:** Granulatköder (GB)  
**Enthält:** (Z)-9-Tricosene  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Umweltgefährlich

**Gefahrenhinweise:**

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig Schädliche Wirkungen haben.

**Sicherheitshinweise:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
S20/21 Bei der Arbeit nicht

essen, trinken, rauchen.  
S22 Staub nicht einatmen.  
S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).  
S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
S60 Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.  
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Biozide sicher verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Registrier-Nr.: 52698



**Mindesthaltbarkeit:** 2 Jahre  
**Chargennummer und Herstellungsdatum:** Siehe Behälter

**Gebrauchsanleitung:**

SOFAST ist ein weißes Granulat mit charakteristischem Geruch und bekämpft Fliegen in Wohnungen, Häusern, landwirtschaftlichen und anderen Gebäuden, in Zoos, Gärten und Grünanlagen. SOFAST kann demnach überall dort angewendet werden, wo lästige Fliegen zu bekämpfen sind.

**Wirkungsweise:**

Der Wirkstoff Imidacloprid gelangt durch Fraß- und Kontaktaufnahme in das Zentralnervensystem der Insekten und verursacht eine Störung in der Übertragung der Nervenimpulse. Nach der Aufnahme des granulatförmigen Köders sterben die Fliegen rasch ab. SOFAST ist einfach anzuwenden und beseitigt die Fliegen schlagartig. Die spezielle Zusammensetzung und die gute Verteilung von Wirk- und Lockstoff führt zu einer sicheren Kontaktaufnahme mit dem Produkt. Der enthaltene Bitterstoff soll zudem eine Aufnahme durch nicht Zielorganismen und Haustiere verhindern.

**Aufwandmenge:**

200g /100m<sup>2</sup> im Streuverfahren oder min. 1 Köderhäufchen / 10m<sup>2</sup>  
100g /100ml Wasser gelöst im Spritz- und Sprühverfahren  
200g /150ml Wasser Im Streichverfahren

**Anwendung:**

SOFAST als Köder-, Sprüh- oder Streichmittel auf sauberen, trockenen Oberflächen von Böden, Wänden, Fensterbänken, etc. aufbringen, auf denen sich aktive Fliegen bevorzugt aufhalten.  
Bei Ausstreuen (200g/100m<sup>2</sup>) auf gleichmäßige Verteilung achten.  
Köderstationen (kleine Teller oder Becher) mit etwas SOFAST beladen, alle 10m<sup>2</sup> etwas erhöht anbringen, alle 2-3 Tage kontrollieren, wenn verunreinigt frisches Produkt vorlegen.  
Zum Ausbringen mit Spritz- oder Sprühgeräten nach Ansetzen der gebrauchsfertigen Lösung (100g/100ml Wasser) ca. 15 min. warten, Behälter gut schütteln, dann bis max. 7-8 h vollständig auftragen.  
Beim Streichverfahren (200g/150ml Wasser) ca. 20 min. zuwarten, bis sich SOFAST gut aufgelöst hat, dann auf saubere, nicht poröse Oberflächen mit Pinsel oder Bürste verstreichen.

**Weitere Sicherheitshinweise:**  
Ködergranulat und wässrige Lösung für Kinder und Haustiere unzugänglich ausbringen.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.  
Kontakt mit Futtermitteln, Lebensmitteln, Zubereitungsflächen, Geschirr vermeiden.  
Nicht in oder um Wasserabflüsse anwenden.  
Giftig für Fische und aquatische Organismen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**Erste Hilfe:**

Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife waschen.  
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und ggf. Arzt hinzuziehen.  
Hinweise für den Arzt: Kein spezifisches Antidot bekannt. Symptomatische Behandlung.

**Notfallauskunft:**

Deutschland: bei allgemeinen Notfällen (Unfall, Brand, Umwelt- / Ökologieereignisse): +49 (0) 69 2222 52 85  
bei Vergiftungen (Giftnotrufzentrale Mainz): +49 (0) 6131 19240

**Lagerung:**

Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden an einem gut belüfteten Ort, kühl, trocken und frostfrei lagern. Für Kinder und Haustiere unzugänglich und getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.

**Entsorgung:**

Leere Verpackungen nicht wiederverwenden. Gut gereinigte Handelsverpackungen können nach geltenden örtlichen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

**Warnung:**

Anwendungen nur gemäß den Anwendungshinweisen. Die Anwendung des Produktes in Anwendungsgebieten, die nicht in der Produktinformation beschreiben sind, sind von uns nicht geprüft. Jegliche Haftung für eventuelle Schäden einer solchen Anwendung wird ausgeschlossen. Dies gilt gleichermaßen für die Nichteinhalten der Warnhinweise für die Anwendung.  
Der Hersteller garantiert die Qualität seiner Produkte in ihrer Originalverpackung.