


ALFA SECT 10x500 ml

▶ INSEKTICID U OBLIKU KONCENTROVANE SUSPENZIJE
ZA SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA



Aktivna supstanca: Alfa-cipermetrin 6% (CAS: 67375-30-8)
Koformulanti i rastvarač do 100%
Formulacija: Koncentrovana suspenzija
Vrsta biocidnog proizvoda: PT18 Insekticid

Proizvođač:
Sharda Cropchem Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra
(West) Mumbai - 400050, India

Uvoznik i distributer za Srbiju:

ZA OPŠTU I PROFESIONALNU UPOTREBU



PAŽNJA

Štetno ako se proguta. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Cuvati van domašaja dece. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. **AKO SE PROGUTA:** Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ako se osećate loše. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

ALFA SECT je insekticid za suzbijanje letećih insekata: komaraca (*Culex quinquefasciatus*), domaćih muva (*Musca domestica*), gmižućih insekata: smeđih bubašvaba (*Blattella germanica*), crnog mrava (*Lasius niger*) i krpelja (iz roda: *Ixodes* i *Dermacentor*). Deluje kontaktno i digestivno. Za opštu i profesionalnu upotrebu.

Mesta primene: ALFA SECT je namenjen za suzbijanje insekata u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima, ruderalnim staništima, kuhinjama, restoranima, hotelima, bolnicama, prostorijama gde se životinje drže i čuvaju. Proizvod se koristi za tretiranje infestiranih površina prskanjem na određeno mesto gde se skupljaju insekti. Aktivna supstanca je stabilna i zbog toga proizvod prskanjem stvara sloj koji dovoljno dugo deluje, ali pri tom ne stvara probleme sa neželjenom akumulacijom.

Pre upotrebe uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu!

Način upotrebe: ALFA SECT se razblažuje sa vodom pre upotrebe. Proizvod se primenjuje pomoću ručnih i motornih prskalica i hladnih rasprskivača za ULV aplikaciju. Potrebna količina vode se ulije u uređaj i doda izmerena količina proizvoda. Prskalicu potom treba dobro protresti, dok ULV uređaji automatski mešaju smešu rastvora. Korišćene uređaje nakon upotrebe treba očistiti vodom. Na površine koje treba tretirati, nanosi se fini sloj spreja. Preporučuje se dvostruka količina kada se radi o zaprljanim ili poroznim površinama ili površinama koje mnogo apsorbuju.

Za redovne tretmane gmižućih i letećih insekata: Rastvoriti 25ml proizvoda u 5l vode, zatim naneti 1 l rastvora proizvoda na 20m² površine. U slučaju teške najezde ili kada se radi o površinama koje su jako infestirane insektima upotrebljava se duplo koncentrovaniji rastvor: rastvoriti 50ml proizvoda u 5 l vode, zatim naneti 1 l rastvora proizvoda na 20 m² površine.

Za ULV tretmane krpelja: Rastvoriti 50 ml proizvoda na 5 l vode, što je dovoljno za površinu od 2.500 m².

Leteći insekti: Naneti na površine gde insekti sleću.

Bubašvabe: Tretirati podnožne letvice i oplata na šporetima, frižiderima i drugim predmetima. Ovi insekti žive skriveni u pukotinama i rupama. Pristup

insekata takvim mestima može se sprečiti prskanjem infestiranih površina u širini traka 10cm.

Crni mravi: Tretirati putanje i površine oko mravljih gnezda. Dodatno se mogu postaviti i insekticidne barijere kako bi se sprečio ulaz mrava u kuću. Ako se gnezda ne pronađu, onda postupak suzbijanja treba podržati upotrebom specifičnih mamaca.

Kavezi za ptice: Naneti po uputstvima za opštu upotrebu, pre nego što ptice uđu u kavez. Naprskati celu površinu kaveza, gnezdo i podove po potrebi. Obratiti pažnju na uglove, pukotine i mesta gde se skupljaju grinje. Ne prskati ptice direktno i ne prskati nad njima.

Krpelji: Tretirati površine na kojima se pojavljuju krpelji. Oni se najčešće nalaze na otvorenim prostorima: zelenim površinama, travnatim i žbunastim zajednicama, šumskom tlu i ruderalnim staništima. Suzbijanje krpelja se može vršiti i unutar objekata (nehigijenski i slabo održavani objekti).

Interval primene i zabrana pristupa: Primenu započeti odmah nakon pojave insekata. Insekti su u potpunosti eliminisani u kratkom vremenskom roku. Vremenski interval zabrane pristupa ljudima i životinjama tretiranim zatvorenim prostorima iznosi 12 sati, dok na otvorenom prostoru iznosi 6 sati. Da bi se postigli što efikasniji rezultati, suzbijanje insekata ponoviti svakih 8 nedelja.

Mere predostrožnosti: Zaštititi od proizvoda: korisne medonosne pčele, domaće i divlje životinje, vodene organizme i decu. Sprečiti kontakt proizvoda sa hranom, hranom za životinje i površinama koje dolaze u kontakt sa hranom. Ne tretirati površine koje su životinjama dostupne za lizanje. Prilikom rada ne jesti, piti i ne pušiti. Ne udisati maglu.

Za profesionalnu primenu koristiti ličnu zaštitnu opremu: odelo, naočare, rukavice i maske sa adekvatnim filterom.

Za opštu upotrebu koristiti rukavice i masku za jednokratnu upotrebu. Nakon rada dobro oprati vodom i sapunom lice, ruke i kožu, a sva korišćenja zaštitna sredstva oprati, očistiti ili baciti u otpad. Sakupiti rasuti sadržaj ukoliko dođe do prosiapanja.

Proizvod je veoma toksičan za vodene organizme i može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodi. Ne treba ga primenjivati blizu vodotokova, bunara, odvodnih kanala i kanalizacije. Ne ispuštati u kanalizaciju. Pripremiti količinu rastvora potrebnu za rad.

Prva pomoć i antidot: Povredeno gledište izvesti na svež vazduh i postaviti u položaj koji je najbolji za normalno disanje. Ako se ne oseća dobro zatražiti pomoć lekara. Pokazati etiketu. Nakon kontakta sa kožom odmah oprati sa dosta vode i sapuna. Ukloniti kontaktna sočiva i ispirati oči najmanje 15 minuta sa dosta vode držeći očne kapke otvorene. Isprati usta. Piti što više vode. Fatalno ako se proguta. U slučaju trovanja zvati Centar za kontrolu trovanja VMA: 011/360 84 40 (24 časa). Lečenje je simptomatsko.

Bezbedno odlaganje otpada i ambalaže: Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Sa ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Skladištenje: Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od -10°C do 40°C. Držati dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. Cuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van dohvata dece, nestručnih osoba i životinja.

Broj akta na osnovu kog se biocidni proizvod čini dostupnim na tržištu i koristi: 532-01-411/2015-19

Datum proizvodnje i broj serije su utisnuti na ambalaži.

Rok trajanja: 4 godine od datuma proizvodnje

Neto pakovanje: 10x500ml