

# DELTA SECT

▶ EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ SUSPENZNÍ KONCENTRÁT (SC)

500 ml



**Výrobce:** Sharda Europe b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
Belgium

**Dovozce do ČR:**



PROFESIONÁLNÍ



## EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ SUSPENZNÍ KONCENTRÁT (SC)

**Název přípravku:** Deltasect

Emulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát (SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiků, proti dospělým komárům, švábům, mouchám a mravencům.

**Účinné látky:** Deltamethrin 25 g/litr (2,5%)

**Vzhled přípravku:** Bílá suspenze

**Číslo povolení:** oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 28564/2013/SOZ

N

### Upozornění:

Ohrožuje zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi a při zasažení očí  
 Dráždí oči a kůži  
 Pro včely škodlivý  
 Pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý  
 Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S23: Nevdechujte páry a aerosoly

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

### Mechanismus účinnosti:

Účinná látka deltamethrin, patříci mezi pyrethroidy působí kontaktně i požitově.

Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.

### Návod k použití

Přípravek Deltasect naředte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohů místností, kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat.

### Dávkování

PROTI LÉTÁJÍCÍMU HMYZU	PROTI LEZOUcíMU HMYZU
50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m <sup>2</sup>	50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m <sup>2</sup>

Reziduální účinnost minimálně 7 dní.

Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům ve vnitřních prostorách domů a v jejich bezprostředním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, restauracích, kantinách, barech, ve skladech, ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.

### Bezpečnostní opatření

Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku.

Kontaminovaný ochranný oděv použijte znovu až po vyprání.

Při aplikaci nejzte, nepijte a nekřte.

Po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje.

Naředěný přípravek ihned spotřebujte.

Pracovní směs musí být připravena vždy těsně před aplikací.

Může působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže

Toxický pro ryby a vodní organismy.

Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže naředěným přípravkem nebo vodou použitou k vyplachování postřikovačů a obalů přípravku.

### První pomoc:

**Při náhodném požití:** nevyvolávejte zvracení. Postiženému nepodávejte nic k pití ani k jídlu.

Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. Vypláchněte ústa vodou a postiženého dopravte k lékařskému ošetření.

**Při zasažení očí:** Otevřené oko/oči vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

**Při zasažení pokožky:** Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

**Při vdechnutí:** Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch ale udržujte jej v teple. Vyhledejte lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

### Skladování

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek.

Nevystavujte přímému slunečnímu svítu

a teplotám vyšším než 40° C.

Chraňte před mrazem.



### Odstraňování obalů a zbytků přípravku

Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.

**Balení:** 500 ml

**Číslo šarže a datum výroby:** viz obal.

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby.